



MEDICI ASSOCIATI

dott. Rolando BEVILACQUA - dott.ssa Anna Barbara CARZANIGA - dott. Maurizio FUMAGALLI
dott.ssa Emanuela GANGI - dott.ssa Lia RATTI - dott.ssa Laura ROSSI

Istruzioni raccolta campioni

<p>SCOTCH TEST (Test di Graham) per la ricerca degli ossiuri</p>	<p>Materiale necessario: Vetrina in apposito portavetrini (da chiedere al punto prelievi) + scotch trasparente (da reperire personalmente)</p> <p>Istruzioni di raccolta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Al mattino appena svegli si applica la parte adesiva di una striscia di scotch trasparente (lungo 7cm x 2 cm circa) contro la cute nell'area perianale, e la si lascia per 10 minuti circa.2) Rimuovere lo scotch ed applicarlo sul vetrino fornito dal punto prelievi, favorendone l'adesione con una leggera pressione.3) Mettere il vetrino con lo scotch nell'astuccio porta vetrini e portare al punto prelievo. <p>Lo scotch permette di catturare le uova e/o le larve facendole aderire alla sua superficie gommosa, poiché gli ossiuri migrano di notte sino all'apertura anale dove depongono le uova.</p> <p>Se l'esame è previsto su 3 campioni di giorni successivi in attesa di consegnarli al punto prelievi, conservarli a temperatura ambiente.</p>
---	---